

子宮頸がん治療後連携パス（退院～3年）

適応基準： Low risk 群（2～3カ月毎）

		術後	退院	1ヶ月後	3ヶ月後			6ヶ月後			1年後			1年6ヶ月後			2年後			2年6ヶ月後					
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医	専門医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医			
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全身倦怠																							
		食欲不振																							
		悪心・嘔吐																							
		下痢・便秘																							
		性器出血																							
		排尿障害																							
		帯下																							
		下血																							
	下腹痛・腰痛																								
採 血	婦人科診察・内診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	血算・生化学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	SCC / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
検 査	経膈超音波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	断端(子宮膈部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	胸腹骨盤部CT(必要時)										○						○								
	胸部レントゲン(必要時)																								
	骨密度測定(必要時)																								
投 薬	そ の 他																								
	一 般 薬																								
指 導	鎮 痛 剤																								
	内 服 確 認																								
	副 作 用 説 明																								
	生 活 指 導																								
そ の 他																									

子宮頸がん治療後連携パス（退院～7年）

適応基準： Low risk 群（4カ月毎）

		術後	3年後		3年8ヶ月後		4年4ヶ月後		5年後		5年8ヶ月後		6年4ヶ月後		7年後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全 身 倦 怠															
		食 欲 不 振															
		悪 心 ・ 嘔 吐															
		下 痢 ・ 便 秘															
		性 器 出 血															
		排 尿 障 害															
		常 下															
		下 血															
	下 腹 痛 ・ 腰 痛																
採 血	婦 人 科 診 察 ・ 内 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血 算 ・ 生 化 学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SCC / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経 膣 超 音 波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断 端 (子 宮 膣 部) 細 胞 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸 腹 骨 盤 部 CT (必 要 時)	○						○									
	胸 部 レ ン ト ゲ ン (必 要 時)																
	骨 密 度 測 定 (必 要 時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	

子宮頸がん治療後連携パス（退院～1年）
適応基準： High risk 群（1～2カ月毎）

		術後	退院	1ヶ月後	2ヶ月後		4ヶ月後		6ヶ月後		8ヶ月後		10ヶ月後		12ヶ月後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医	専門医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全 身 倦 怠															
		食 欲 不 振															
		悪 心 ・ 嘔 吐															
		下 痢 ・ 便 秘															
		性 器 出 血															
		排 尿 障 害															
		常 下															
		下 血															
		下 腹 痛 ・ 腰 痛															
採 血	婦 人 科 診 察 ・ 内 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血 算 ・ 生 化 学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SCC / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経 膣 超 音 波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断 端 (子 宮 膣 部) 細 胞 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸 腹 骨 盤 部 CT (必 要 時)							○								○	
	胸 部 レ ン ト ゲ ン (必 要 時)																
	骨 密 度 測 定 (必 要 時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	

子宮頸がん治療後連携パス（退院～3年）

適応基準： High risk 群（1～3カ月毎）

		術後	1年1ヶ月後		1年4ヶ月後		1年7ヶ月後		1年10ヶ月後		2年1ヶ月後		2年4ヶ月後		2年7ヶ月後		2年10ヶ月後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全身倦怠																	
		食欲不振																	
		悪心・嘔吐																	
		下痢・便秘																	
		性器出血																	
		排尿障害																	
		帯下																	
		下血																	
	下腹痛・腰痛																		
採 血	婦人科診察・内診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血算・生化学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SCC / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経膈超音波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断端(子宮腔部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸腹骨盤部CT(必要時)	○							○										
	胸部レントゲン(必要時)																		
	骨密度測定(必要時)																		
投 薬	そ の 他																		
	一 般 薬																		
指 導	鎮 痛 剤																		
	内 服 確 認																		
	副 作 用 説 明																		
	生 活 指 導																		
そ の 他																			

子宮頸がん治療後連携パス（退院～10年）

適応基準： High risk 群（3～6カ月毎）

		術後	3年1ヶ月後		3年7ヶ月後		4年1ヶ月後		4年7ヶ月後		5年1ヶ月後		5年7ヶ月後		6年1ヶ月後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全 身 倦 怠															
		食 欲 不 振															
		悪 心 ・ 嘔 吐															
		下 痢 ・ 便 秘															
		性 器 出 血															
		排 尿 障 害															
		常 下															
		下 血															
	下 腹 痛 ・ 腰 痛																
採 血	婦 人 科 診 察 ・ 内 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血 算 ・ 生 化 学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SCC / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経 膣 超 音 波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断端(子宮膣部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸腹骨盤部CT(必要時)	○						○									
	胸部レントゲン(必要時)																
	骨密度測定(必要時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	