

子宮体がん治療後連携パス（退院～3年）

適応基準： Low risk 群（2～3カ月毎）

		術後	退院	1ヶ月後	3ヶ月後			6ヶ月後			1年後			1年6ヶ月後			2年後			2年6ヶ月後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
施 設		専門医	専門医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医	
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診 察	問 診	全身倦怠																				
	食 欲 不 振																					
	悪 心 ・ 嘔 吐																					
	下 痢 ・ 便 秘																					
	性 器 出 血																					
	排 尿 障 害																					
	常 下																					
	下 血																					
	下 腹 痛 ・ 腰 痛																					
採 血	婦人科診察・内診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	血算・生化学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CA125 / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検 査	経膈超音波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	断端(子宮腔部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	胸腹骨盤部CT(必要時)									○							○					
	胸部レントゲン(必要時)																					
	骨密度測定(必要時)																					
投 薬	そ の 他																					
	一 般 薬																					
指 導	鎮 痛 剤																					
	内 服 確 認																					
	副 作 用 説 明																					
	生 活 指 導																					
そ の 他																						

子宮体がん治療後連携パス（退院～7年）

適応基準： Low risk 群（4カ月毎）

		術後	3年後		3年8ヶ月後		4年4ヶ月後		5年後		5年8ヶ月後		6年4ヶ月後		7年後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全 身 倦 怠															
		食 欲 不 振															
		悪 心 ・ 嘔 吐															
		下 痢 ・ 便 秘															
		性 器 出 血															
		排 尿 障 害															
		常 下															
		下 血															
	下 腹 痛 ・ 腰 痛																
採 血	婦 人 科 診 察 ・ 内 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血 算 ・ 生 化 学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CA125 / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経 膣 超 音 波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断端(子宮膣部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸腹骨盤部CT(必要時)	○						○									
	胸部レントゲン(必要時)																
	骨密度測定(必要時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	

子宮体がん治療後連携パス（退院～1年）
 適応基準： High risk 群（1～2カ月毎）

		術後	退院	1ヶ月後	2ヶ月後		4ヶ月後		6ヶ月後		8ヶ月後		10ヶ月後		12ヶ月後		
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
施 設		専門医	専門医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医		
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
診 察	問 診	全身倦怠															
		食欲不振															
		悪心・嘔吐															
		下痢・便秘															
		性器出血															
		排尿障害															
		帯下															
		下血															
	下腹痛・腰痛																
採 血	婦人科診察・内診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血算・生化学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CA125 / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経膈超音波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断端(子宮膈部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸腹骨盤部CT(必要時)							○								○	
	胸部レントゲン(必要時)																
	骨密度測定(必要時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	

子宮体がん治療後連携パス（退院～3年）
適応基準： High risk 群（1～3カ月毎）

		術後	1年1ヶ月後		1年4ヶ月後		1年7ヶ月後		1年10ヶ月後		2年1ヶ月後		2年4ヶ月後		2年7ヶ月後		2年10ヶ月後
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
診 察	問 診	全身倦怠															
		食欲不振															
		悪心・嘔吐															
		下痢・便秘															
		性器出血															
		排尿障害															
		帯下															
		下血															
	下腹痛・腰痛																
採 血	婦人科診察・内診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	血算・生化学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CA125 / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
検 査	経膈超音波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	断端(子宮腔部)細胞診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	胸腹骨盤部CT(必要時)	○						○									
	胸部レントゲン(必要時)																
	骨密度測定(必要時)																
投 薬	そ の 他																
	一 般 薬																
指 導	鎮 痛 剤																
	内 服 確 認																
	副 作 用 説 明																
	生 活 指 導																
そ の 他																	

子宮体がん治療後連携パス（退院～10年）

適応基準： High risk 群（3～6カ月毎）

		術後	3年1ヶ月後		3年7ヶ月後		4年1ヶ月後		4年7ヶ月後		5年1ヶ月後		5年7ヶ月後		6年1ヶ月後	
予 約 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
施 設		専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	専門医もしくは かかりつけ医	かかりつけ医	
検 診 日		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
診 察	問 診	全 身 倦 怠														
		食 欲 不 振														
		悪 心 ・ 嘔 吐														
		下 痢 ・ 便 秘														
		性 器 出 血														
		排 尿 障 害														
		常 下														
		下 血														
	下 腹 痛 ・ 腰 痛															
採 血	婦 人 科 診 察 ・ 内 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	血 算 ・ 生 化 学	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CA125 / CEA / その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
検 査	経 膈 超 音 波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	断 端 (子 宮 膈 部) 細 胞 診	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	胸 腹 骨 盤 部 CT (必 要 時)	○						○								
	胸 部 レ ン ト ゲ ン (必 要 時)															
	骨 密 度 測 定 (必 要 時)															
投 薬	そ の 他															
	一 般 薬															
指 導	鎮 痛 剤															
	内 服 確 認															
	副 作 用 説 明															
	生 活 指 導															
そ の 他																